

## TWEEDE DEELTENTAMEN WISB 212

### Analyse in Meer Variabelen

30-06-2004 14–17 uur

- Zet uw naam en collegekaartnummer op elk blad, alsmede het totaal aantal ingeleverde bladzijden.
- De verschillende onderdelen van de vraagstukken zijn zoveel als mogelijk is, onafhankelijk van elkaar. Indien u een bepaald onderdeel niet of slechts ten dele kunt maken, mag u de resultaten daaruit gebruiken bij het maken van de volgende onderdelen.
- Bij dit tentamen mogen syllabi en/of rekenmachine **NIET** worden gebruikt.

**Exercise 0.1 (Catenoïde).** We definiëren  $\cosh s = \frac{1}{2}(e^s + e^{-s})$  en verder

$$\phi : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3 \quad \text{door} \quad \phi(s, t) = (\cosh s \cos t, \cosh s \sin t, s),$$

en we beschouwen het oppervlak  $C = \text{im}(\phi)$ , waarvan zonder bewijs mag worden gebruikt dat het een  $C^\infty$  deelvariëteit in  $\mathbf{R}^3$  van dimensie 2 is. (Zeepvliezen tussen twee concentrische parallelle cirkels hebben dikwijls de vorm van een deel van dit oppervlak.) Zij  $a \in \mathbf{R}_+$  willekeurig gekozen.

Voor gebruik in dit vraagstuk herinneren we aan de formules

$$\sinh s = \frac{1}{2}(e^s - e^{-s}), \quad \cosh^2 s - \sinh^2 s = 1, \quad \cosh^2 s + \sinh^2 s = \cosh 2s, \quad 2 \cosh s \sinh s = \sinh 2s.$$

- (i) Bewijs dat de lengte van de spiraalvormige kromme  $K_a = \{\phi(s, s) \mid |s| \leq a\}$  op  $C$  gelijk is aan  $2\sqrt{2} \sinh a$ .

Definieer  $f : \mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{R}$  door  $f(a) = \pi(a + \cosh a \sinh a)$ .

- (ii) Bewijs dat de oppervlakte van de deelverzameling  $C_a$  van  $C$  bestaande uit de  $x \in C$  met  $|x_3| < a$  gelijk is aan  $2f(a)$ .

Voor  $a \in \mathbf{R}_+$  definiëren we  $\Omega_a \subset \mathbf{R}^3$  als de begrensde open deelverzameling begrensd door  $C_a$  en de twee schijven

$$D_a^\pm = \{x \in \mathbf{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 \leq \cosh^2 a, x_3 = \pm a\}.$$

- (iii) Bewijs dat  $\text{vol}_3(\Omega_a) = f(a)$  met behulp van 3-dimensionale integratie.

- (iv) Pas de Divergentiestelling van Gauss toe met  $\Omega_a$  en het vectorveld  $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$  gegeven door  $f(x) = (x_1, x_2, 0)$ , en verklaar zodoende de relatie tussen de resultaten uit de onderdelen (ii) en (iii).

**Exercise 0.2 (Golfoperator).** We definiëren de open sector  $U$  in  $\mathbf{R}^2$  en de differentiaaloperator  $\square$  op  $\mathbf{R}^2$ , respectievelijk, door

$$U = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}_+ \times \mathbf{R} \mid |x_2| < x_1\}, \quad \square = D_1^2 - D_2^2,$$

en zij verder  $\phi : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$  een willekeurige  $C^\infty$  functie met compacte drager. Op twee verschillende manieren zullen we de volgende identiteit bewijzen:

$$(\star) \quad \int_U \square \phi(x) dx = 2\phi(0).$$

Definieer voor de eerste manier  $\Psi \in \text{Mat}(2, \mathbf{R})$  door  $\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ .

- (i) Bewijs dat  $\Psi \in \mathbf{SO}(2, \mathbf{R})$  en toon aan dat  $\Psi$  de rotatie in  $\mathbf{R}^2$  om de oorsprong over de hoek  $-\frac{\pi}{4}$  is. Leid hieruit af dat  $\Psi : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$  een  $C^\infty$  diffeomorfisme is met de eigenschap  $U = \Psi(V)$  indien  $V = \mathbf{R}_+^2$ . Toon aan dat  $D\Psi(y) = \Psi$  en bereken  $\det D\Psi(y)$ , voor alle  $y \in \mathbf{R}^2$ .
- (ii) Schrijf  $\phi \circ \Psi = \tilde{\phi} : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$  en bewijs middels de kettingregel de volgende identiteit van afbeeldingen van  $\mathbf{R}^2$  naar  $\text{Lin}(\mathbf{R}, \mathbf{R}^2)$ :

$$\begin{pmatrix} \widetilde{D}_1 \phi \\ \widetilde{D}_2 \phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_1 \phi \\ D_2 \phi \end{pmatrix} \circ \Psi = \Psi \begin{pmatrix} D_1 \tilde{\phi} \\ D_2 \tilde{\phi} \end{pmatrix}; \quad \text{en concludeer}$$

$$\widetilde{D}_i \phi = \frac{1}{\sqrt{2}}((-1)^{i-1} D_1 + D_2) \tilde{\phi} \quad (1 \leq i \leq 2).$$

Pas nu de laatstgenoemde identiteit toe met  $\phi$  vervangen door  $D_i \phi$ , met  $1 \leq i \leq 2$  respectievelijk, en bewijs

$$(\square \phi) \circ \Psi = 2D_1 D_2 \tilde{\phi}.$$

Welke stelling is nodig bij het bewijs van de laatste identiteit?

- (iii) Toon nu aan m.b.v. de onderdelen (i) en (ii) alsmede de Hoofdstelling van de Integraalrekening dat de identiteit in  $(\star)$  geldt.

In de nu volgende onderdelen (v) tot en met (vii) geven we een tweede, onafhankelijk, bewijs van  $(\star)$  middels de Integraalstelling van Green. Beschouw hiertoe het vectorveld

$$f = S \text{grad } \phi = \begin{pmatrix} D_2 \phi \\ D_1 \phi \end{pmatrix} : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2, \quad \text{met} \quad S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2, \mathbf{R}).$$

- (iv) Bewijs de identiteit  $\text{curl } f = \square \phi$  van functies op  $\mathbf{R}^2$ .
- (v) Verifieer dat een positieve parametrisering  $y : \mathbf{R} \rightarrow \partial U$  wordt gegeven door

$$y(s) = \begin{pmatrix} \text{sgn}(s) s \\ -s \end{pmatrix} \quad (s \in \mathbf{R}),$$

waarbij  $\text{sgn}$  de tekenfunctie is. Toon vervolgens aan

$$Dy(s) = \begin{pmatrix} \text{sgn}(s) \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{en} \quad SDy(s) = -\text{sgn}(s) Dy(s) \quad (s \in \mathbf{R} \setminus \{0\}),$$

en concludeer met de kettingregel

$$-\text{sgn}(s) \frac{d(\phi \circ y)}{ds}(s) = \langle f \circ y, Dy \rangle(s) \quad (s \in \mathbf{R} \setminus \{0\}).$$

- (vi) Gebruik de compactheid van de drager van  $\phi$  om aan te tonen dat de identiteit uit de Integraalstelling van Green geldig is voor de onbegrensde open verzameling  $U$  en het vectorveld  $f$ , en concludeer met behulp van deze identiteit alsmede de onderdelen (v) en (vi) dat  $(\star)$  volgt.

**Solution of Exercise 0.1**

(i) For  $s \in \mathbf{R}$  and  $\psi(s) := \phi(s, s) = (\cosh s \cos s, \cosh s \sin s, s)$ , we have

$$D\psi(s) = (\sinh s \cos s - \cosh s \sin s, \sinh s \sin s + \cosh s \cos s, 1),$$

$$\|D\psi(s)\|^2 = \sinh^2 s + \cosh^2 s + 1 = \sinh^2 s + \cosh^2 s + \cosh^2 s - \sinh^2 s = 2 \cosh^2 s.$$

Therefore the desired length is given by

$$\sqrt{2} \int_{-a}^a \cosh s \, ds = 2\sqrt{2}[\sinh s]_0^a = 2\sqrt{2} \sinh a.$$

(ii) We have the following equalities of vectors, evaluated at the point  $(s, t) \in \mathbf{R}^2$ ,

$$\frac{\partial \phi}{\partial s} = \begin{pmatrix} \sinh s \cos t \\ \sinh s \sin t \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial \phi}{\partial t} = \begin{pmatrix} -\cosh s \sin t \\ \cosh s \cos t \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial \phi}{\partial s} \times \frac{\partial \phi}{\partial t} = -\cosh s \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ -\sinh s \end{pmatrix},$$

$$\text{hence} \quad \left\| \frac{\partial \phi}{\partial s} \times \frac{\partial \phi}{\partial t} \right\| (s, t) = \cosh s \sqrt{1 + \sinh^2 s} = \cosh^2 s.$$

Now

$$2 \int_0^a \cosh^2 s \, ds = \int_0^a (1 + \cosh 2s) \, ds = [s + \frac{1}{2} \sinh 2s]_0^a = a + \cosh a \sinh a.$$

Note that  $\phi$  is not an embedding with image equal to  $C_a$ , but that we can make it so, up to a negligible set, by restricting  $\phi$  to the subset  $] -a, a[ \times ] -\pi, \pi [$  of  $\mathbf{R}^2$ . This gives

$$\text{area}(C_a) = 2 \int_{-\pi}^{\pi} \int_0^a \left\| \frac{\partial \phi}{\partial s} \times \frac{\partial \phi}{\partial t} \right\| (s, t) \, ds \, dt = 4\pi \int_0^a \cosh^2 s \, ds = 2f(a).$$

(iii) Introduce cylindrical coordinates  $x = \Psi(r, t, s) = (r \cos t, r \sin t, s)$  in  $\mathbf{R}^3$ ; then it is a well-known computation that  $|\det D\Psi(r, t, s)| = r$ . Applying the Change of Variables Theorem and the computation of the definite integral of  $\cosh^2$  from part (ii) we get

$$\text{vol}_3(\Omega_a) = 2 \int_0^a \int_{-\pi}^{\pi} \int_0^{\cosh s} r \, dr \, dt \, ds = 2\pi \int_0^a \cosh^2 s \, ds = f(a).$$

(iv) Gauss' Divergence Theorem asserts

$$\int_{\Omega_a} \text{div } f(x) \, dx = \int_{C_a} \langle f, \nu \rangle(y) \, d_2 y + \sum_{\pm} \int_{D_a^{\pm}} \langle f, \nu \rangle(y) \, d_2 y.$$

Now  $\text{div } f = 2$ . Furthermore, for  $y \in C_a$ , we obtain from the computation of the exterior product and its norm in part (ii), inserting a minus sign because we need the outer normal,

$$\langle f, \nu \rangle(y) = \left\langle \begin{pmatrix} \cosh s \cos t \\ \cosh s \sin t \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\cosh s} \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ -\sinh s \end{pmatrix} \right\rangle = 1.$$

And finally  $\nu(y) = \pm e_3$  implies  $\langle f, \nu \rangle(y) = 0$ , for all  $y \in D_a^{\pm}$ . As a consequence we obtain on the strength of part (ii)

$$2 \text{vol}_3(\Omega_a) = \text{area}(C_a) = 2f(a).$$

**Solution of Exercise 0.2**

(i) We have

$$\Psi^t \Psi = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = I \quad \text{and} \quad \det \Psi = \frac{1}{2}(1+1) = 1.$$

Accordingly  $\Psi \in \mathbf{SO}(2, \mathbf{R})$  and therefore it is of the form  $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ , that is,  $\cos \alpha = -\sin \alpha = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ , hence  $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ . In particular,  $\Psi \in \text{Aut}(\mathbf{R}^2)$ , which implies that  $\Psi : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$  is a  $C^\infty$  diffeomorphism.  $D\Psi(y) = \Psi$  follows from  $\Psi \in \text{End}(\mathbf{R}^2)$ , and so  $\det D\Psi(y) = 1$ , for all  $y \in \mathbf{R}^2$ .

(ii) The chain rule, transposition and the orthogonality of  $\Psi$ , successively, imply

$$\begin{aligned} D(\phi \circ \Psi) &= (D\phi) \circ \Psi D\Psi, \quad \implies \quad \text{grad } \tilde{\phi} = (D\Psi)^t (\text{grad } \phi) \circ \Psi, \\ \implies \quad \widetilde{\text{grad } \phi} &= (\text{grad } \phi) \circ \Psi = ((D\Psi)^t)^{-1} \text{grad } \tilde{\phi} = \Psi \text{grad } \tilde{\phi}. \end{aligned}$$

As a consequence we obtain, for  $1 \leq i \leq 2$ ,

$$\begin{aligned} \widetilde{D_i^2 \phi} &= \frac{1}{\sqrt{2}}((-1)^{i-1} D_1 + D_2) \widetilde{D_i \phi} = \frac{1}{2}((-1)^{i-1} D_1 + D_2)^2 \tilde{\phi}, \\ \implies \quad (\square \phi) \circ \Psi &= \frac{1}{2}((D_1 + D_2)^2 - (-D_1 + D_2)^2) \tilde{\phi} = 2D_1 D_2 \tilde{\phi}, \end{aligned}$$

where we used Theorem 2.7.2 on the equality of mixed partial derivatives.

(iii) In fact, the Change of Variables Theorem 6.6.1 and Theorem 6.4.5 imply

$$\begin{aligned} \int_U \square \phi(x) dx &= \int_{\Psi(V)} \square \phi(x) dx = \int_V (\square \phi) \circ \Psi(y) |\det D\Psi(y)| dy \\ &= 2 \int_{\mathbf{R}_+} \int_{\mathbf{R}_+} D_1(D_2 \tilde{\phi})(y_1, y_2) dy_1 dy_2 = -2 \int_{\mathbf{R}_+} D_2 \tilde{\phi}(0, y_2) dy_2 \\ &= 2\tilde{\phi}(0) = 2\phi((\Psi(0))) = 2\phi(0). \end{aligned}$$

(iv) In the notation of Formula (8.21) and Lemma 8.3.10.(iii) we have

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = J^-.$$

Since  $J \in \mathbf{SO}(2, \mathbf{R})$

$$\text{curl } f = \text{div}(J^t f) = \text{div}(J^t J \overline{\text{grad } \phi}) = \text{div}(\overline{\text{grad } \phi}) = (D_1^2 - D_2^2)\phi = \square \phi.$$

(v) Differentiation gives the formula for  $Dy(s)$  upon noticing that  $\text{sgn}$  is a locally constant function.

$v(y(s)) = -\begin{pmatrix} 1 \\ \text{sgn}(s) \end{pmatrix}$ , and accordingly

$$\det(v \circ y \mid Dy)(s) = \begin{vmatrix} -1 & \text{sgn}(s) \\ -\text{sgn}(s) & -1 \end{vmatrix} = 2 > 0.$$

Therefore  $y : \mathbf{R} \rightarrow \partial U$  is a positive parametrization. We have

$$SDy(s) = \begin{pmatrix} -1 \\ \text{sgn}(s) \end{pmatrix} = -\text{sgn}(s) \begin{pmatrix} \text{sgn}(s) \\ -1 \end{pmatrix} = -\text{sgn}(s)Dy(s).$$

We now obtain by means of the chain rule and  $S' = S$ , for  $s \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$ ,

$$\begin{aligned} \frac{d(\phi \circ y)}{ds}(s) &= D\phi(y(s))Dy(s) = -\text{sgn}(s)\langle \text{grad } \phi(y(s)), SDy(s) \rangle \\ &= -\text{sgn}(s)\langle (S \text{grad } \phi) \circ y(s), Dy(s) \rangle = -\text{sgn}(s)\langle f \circ y, Dy \rangle(s). \end{aligned}$$

(vi) On the basis of Green's Integral Theorem 8.3.5 and the compact support of  $\phi$  we find

$$\begin{aligned} \int_U \square \phi(x) dx &= \int_U \text{curl } f(x) dx = \int_{\partial U} \langle f(y), d_1 y \rangle = \int_{\mathbf{R}} \langle f \circ y, Dy \rangle(s) ds \\ &= -\text{sgn}(s) \int_{\mathbf{R}} \frac{d(\phi \circ y)}{ds}(s) ds = \int_{-\infty}^0 \frac{d(\phi \circ y)}{ds}(s) ds \\ &\quad - \int_0^{\infty} \frac{d(\phi \circ y)}{ds}(s) ds = \phi(y(0)) - (-\phi(y(0))) = 2\phi(0). \end{aligned}$$